

Fresno Dental Surgery Center
2828 Fresno Street, Suite 100
Fresno, Calif. 93721 559-263-9648

Instrucciones Para Cuidado Despues De Tratamiento Dental Bajo Anestesia General

- > Pacientes pueden reaccionar en diferentes maneras despues de tratamiento dental bajo anestesia general.

Los mas comunes son:

Medio dormido y sin deseos de hacer nada
Histerico o Hiperaactivo
Confundido y desorientado
Combativo y enojado
Calmado y contento
De mal humor

- > Cada persona es deferente, asi que es casi imposible de anticipar de antemano como el paciente va actuar.
- > Pacientes pueden tener hambre o nauseas. El tiempo requerido para que nuestro cuerpo elimine la droga anestesia es aproximada mente de 2 a 4 horas. Durante este tiempo ellos tienen que ser supervisados por adulto responsable. Si tienen hambre, empieze con agua liquidos o hasta que haya determinado si se sienten con nausea. Comidas solidas inmediatamente despues de sirugia casi siempre garantisan nausea vomito.
- > Algunas veces el paciente puede tener una poquita de fiebre o dolor despues del tratamiento. Si es asi Tylenol o Advil se puede dar segun las instrucciones en la botella hasta que los sintomas hayan Desaparecido.
- > Las cosas que deben de vijilar es, si sienten comeson, o tienen sarpullido en la piel, o dificultad respirando. Esto puede indicar una reaccion alergica delatada. Si vomita mucho puede debilitarse. Si algunas de estas condiciones se presentan favor de llamar 559 263-9648 o 1-800 504-4714 si la oficina esta cerrada. para hablar con el dentista.

Fecha: _____

Firma Paciente O Guardian